

串

雅

自序

周禮分醫為四有疾醫食醫瘍醫獸醫後乃有十三科而未聞走方之名也物原記岐黃以來有鍼灸厥後巫彭製藥丸伊尹創煎藥而未聞有禁截諸法也晉王叔和纂脈經叙陰陽內外辨部候經絡臟腑之病為最詳金張子和以吐汗下三法風寒暑濕火燥六門為醫之關鍵終未聞有頂串諸名也有之自草澤醫始草澤醫乃世所謂走方也人每訶詆之謂其遊食江湖貨藥吮舐行則類丐挾技劫病貪利恣睢

心又類盜且剽竊醫緒倡為詭異敗草毒劑悉曰仙
遺剗滌魔迷詫曰神授輕淺之疾或可貪天沉痾之
灾烏能起廢雖然是誠有焉不可槩論也為問今之
乘華軒繁徒衛者皆能識諸症知脈辨藥通其元妙
乎則儼然我高冠竊虛譽矣今之遊權門享厚奉者
皆能決死生達內外定方劑十全無失者乎則儼然
踞高座侈功德矣是知笑之為笑而不知非笑之為
笑也予幼嗜岐黃家言性尤好奇閱書自靈素難經
而下旁及道藏石室考穴自銅人內景圖而下更及

太素奇經傷寒則仲景外編及金鞞木索本草則綱目外遠及海錄丹房有得輒抄忘倦不自知結習至此然聞走醫中有頂串諸術操技神而奏效捷以此獲食其徒侶多動色相戒秘不輕授又多一知半解罕有通貫者以故欲宏覽而無由焉宗子柏雲挾是術且老矣戊寅航海歸過予質其道皆有奧理不悖于古顧其方旁涉元禁瑣及游戲未免誇新鬥異為國醫所不道因取其所授手抄重加芟訂存其可濟于世合予平昔所錄奇方悉依原次彙成一編日串

出雅

自序

二

雅不欲泯其實也并矯奇而俾歸于雅使後之習是
術不致為庸俗所詆忌殆亦柏雲所心許者昔歐陽
子暴痢幾絕乞藥于牛醫李防禦治嗽得官傳方於
下走誰謂小道不有可觀者與其亦善用斯術也可
乾隆己卯十月恕軒趙學敏序

緒論

負笈行醫周遊四方俗呼為走方其術始于扁鵲華陀繼之故其所傳諸法亦與國醫異治外以鍼刺

蒸灸治內以頂串禁截取其速驗不計萬全也

手所持器以鐵為之形如環盂虛其中竅置鐵丸周轉搖之有聲名曰虎刺乃起于宋李次口次口走

李咨也
訛為次口

醫也行深山有虎齧刺于喉求拔之以咨置此器于虎口為拔其刺後其術大行名聞江湖祖其術者率持此器即呼虎刺云

三寸藻異
作虎撐

所提藥囊曰無且囊云秦無且所用者鍼曰鉞鍼有小袋曰羅星袋有小尺曰分脈尺有藥點之鏡曰語魅有馬口鐵小箇用以取牙名曰折脆所作偽藥皆曰何蕪草藥曰夾艸持竿布賣膏藥曰貨軟作道妝僧服曰游方用鍼曰挑紅用刀曰放紅撮痧曰標印艾火曰秉離水調曰填冷與人治病曰打樁兩人合治曰攏工共分酬金曰破洞賺人財帛曰撈爪脫險曰出洞如此之類不能悉載畧舉一二焉

走方有三字訣一曰賤藥物不取貴也二曰驗以下咽即能去病也三曰便山林僻邑倉卒即有能守三字之要便是能品

有四驗以堅信流俗一取牙二點痣三去翳四捉蟲俱憑藥又手法有四驗用鍼要知補瀉推拿要識虛實揉拉在緩而不痛鉗取在速而不慌志欲傲禮欲恭語欲大心欲小持此勿失即為老手

藥上行者皆曰頂下行者皆曰串故頂藥多吐串藥多瀉頂串而外則曰截截絕也如絕害然按此即

古汗吐下三法也然有項中之串二中之項藥更
元妙用意入神則又不可以常格拘也

藥有常用之品有常棄之品走方皆收之病有常見
之症有罕見之症走方皆習之故有二難曰用藥
難識症難非通乎陰陽察乎微妙安能使沉疴立
回名醫拱手誰謂小道不有可觀者然則今之煦
煦惟利是視言偽而辯開方則筆似懸槌臨症則
目如枯炭直謂之醫奴可耳

藥有奇性不必醫皆知之而走方不可不知脉有奇

經不必醫盡知之而走方不可不知用竒來間一時之捷徑也得心應手平日之熟練也古人出則行道入則讀書蓋醫學通乎性命知醫則知立命而一切診戾不能中之可以却疾延年否則已身難免于危又烏能救人之危耶

醫本期于濟世疾能治則治之不必存貧富之見近率以醫為行業謂求富者莫如行醫于是朋黨角立趨利如鶩入主出奴各成門戶在延醫者每以病試醫在醫病者又以藥試病兩相茫然迄無成

效幸而偶中則偽竊標榜走方之術類聚既非鄉里論道罕見精微惟各挾一長以遨遊逐食忌則相賊合則相呼如雀隼之交謹誣莫定有似此者勿讀吾書

藥有最驗者曰丹頭即剗劑是也病除後必不可再用走方多挾此以博效人每詫奇絕此後再求餘藥則授以丸曰除餘疾也輒索高價不知此即市于藥肆中所棄根渣不論寒熱溫和平取而剗製為丸以賤售而貴取所謂撈爪是也有似此者勿

讀吾書

醫者意也用藥不如用意治有未效必以意求苟意入元微自理有洞解然後用藥無不立驗今則每持祖方為長技用而偶驗則留根不除俟再發而再獲也用而不驗則率用猛毒之藥以攻之所謂下殺手也在實症或間有轉機而虛人不且立斃乎彼不知用意在平日之講求也凡平日羣居科譚入市招搖貪饕沉酗不知潛心理道者勿讀吾書

串鞋

緒論

截法中有點金藥攔江網八面鋒如鯽魚霜中分散
截骨移毒皆點金藥也黃雀丹青囊丸皆攔江網
也兌金鯉鯪皆八面鋒也俱不可不知

走方子內科有變病法如約脾丸中之用木瓜露以
閉溺竅掩月散中之用鯉脊鱗以遮瞳神取貝母
中之丹龍睛以弛髓脈剔刺蝟中之連環骨以縮
骨筋外科則用白硃砂以種毒蛇草灰以種瘡即
九種十三根之類更有合扁豆膏以留瘡曼陀酒
以留癰甚則醉獸散之可以病馬牛金鍼丸之可

以困花木種種不仁愈降愈甚良由操技不精欲
藉此遂其罔利之心耳余雖盡刪其法而不能盡
絕其傳也故述其槩亦不可不知

凡例

一是編分內外二種首列其要次及其餘合之諸法畢脩分之仍各有妙用棄俗從雅庶覽者得有流別知所先後則近道矣

一醫方必分症類次茲則從法集方有一病而諸門俱入者以其各有治法故方不以類聚不欲紊其成其法也

一柏雲手抄有市語宗派神用運收一卷言多不經且啟人漁利之私急為芟削間採一二入緒

論中以廣知焉

一頂串中截為走醫一大法以譬三才也末流輒
妄定成數有九頂十三串七十二截等目每自
誇于人輒曰某得幾頂幾串幾截其法甚秘
云罕有全知者不知以類統計詎止區區者余
因盡發其秘不惜錄示非欲矜長良由濟世一
端多益善也外有九種十三根等法能拔骨
髓諸毒外出然不肖瘍科每竊以取利種毒留
根變小成大實則為利淺而受害深也寧棄而

不錄

一禁法之大莫如水法次則祝由茲錄其小者絕
擾屏器均無妨于大雅其有近于巫覡所為者
概在所擯

一方用單行奏功最捷藥有製品取效更神鍼灸
輔藥力所不及也故列藥外百物又推思所宜
及也故列醫外奇病所以備其法藥戲所以博
其趣皆以神妙用而奏厥功也因並存之

一藥品尚真奚錄偽焉曰所以著奸也知其術始

不受其愚而作偽者更無以巧取厚利殆猶刪詩
不去鄭衛之意矧其中有可用者若假象皮膏
之收口假乳香之定痛著效更捷於真亦方術
所不廢也至若蒙汗麻廢等方予皆有之而不
脩錄者恐易以啟奸且已列腫聖整骨諸術矣
何多贅焉

二取蟲為走醫第一要法而選元有起死回生之
術無此二門則無由見神故兼存不廢

一是書初著尚有靈穴經奇脈經靈章經識症論

變症論及陽取陰取隔二隔三諸法當另為一編以問世

一是書採錄得於柏雲手抄者十之三百草鏡救生海者十之三養素園及江蘭方本者十之三其一則傳於世醫者悲纍而成帙蓋筌蹄由始例得並誌焉

中雅內編總目

卷之一

截藥

總治門

黃鶴丹

鯉鯪丸

普濟丹

發汗散

仙桃丸

青囊丸

蜜犀丸

蓬萊丸

松梅丸

允金丸

餘糧丸

八仙丹

花蕊石散

三黃丸

紫陽塞鼻丹

神仙太乙膏

截藥

內治門

通真子救苦丹

半分散

治傷寒結胸

拿瘡

宣本散

升陰陽

辟瘟丹

截頭風

頭痛

鶴頂丹

痰火神方

時行痰嗽

保靈丹

六感丹

治尸厥

獨步散

膈氣暫開關方

起癰神丹

坎離丸

元德膏

解惡仙丹

治老人不寐

安寐丹

瀉火聖神湯

鬼毒風氣

截酒積

靈寶化積膏

蠶蚕散

回癲湯

逐呆仙丹

啟迷丹

摩腰丹

威喜丸

蟲腦

分水神丹

燒鍼丸

截癲

收呆至神湯

起迷奇效湯

起痿神湯

貼腰膏

截腦

血腦

疝氣神方

千金不傳韋氏方

腹內龜病

去鈴九

返魂丹

鐵刷丸

截瀉九

寧堂和暖臍膏

截水腫

截黃

截痢

加味綠礬丸

貼目取翳

治目多淚

倣西洋眼藥

二百味花草膏

截障

開聾

耳聾開竅奇方

補藥方

通耳神丹

黑龍膏

中分散

神穴丹

稀痘丹

換痘丹

治傷寒

珍珠滾痰丸

附接骨仙桃草

喉風閉塞

吹喉藥

冰梅丸

仙傳急驚散

陳氏神效小紅丸

梅花丸

釘胎丸

千金硝石丸

卷之二

截藥

外治門

散毒仙丹

陰陽黃

發背膏藥

一筆消

大提藥方

白靈藥

白降丹

消毒散

五毒丹

大黑虎膏

移毒方

黃提藥

紅升丹

五寶霜

醉仙散

大麻瘋

乳香散

聚疔毒

瘰癧奇方

提氣湯

消瘰癧痰核

神授五公散

破癰點藥

再造散

秘練楊梅瘡藥

取疔膏

消疔

生肌膏

三妙散

提瘰丹

三品錠子

治火丹

治瘡二法

掃疥

諸瘡藥

一擦光又

小金絲膏

九熏丹

枯瘤散

治瘤

取痣餅藥

擦瘡成水

七製松香膏

破棺丹

諸般瘡疥加鍼法

截癬

日本國癬藥

飲瘤膏

治流方火方

點痣藥

點黑痣

治癰瘡

透骨丹

勝金丹

松肉葱白膏

小金蓮

撥傷

整骨麻藥

截骨神方

天下第一金瘡藥

接骨至神丹

陰囊爛盡

美首膏

手足皸裂

治陰蝕

治體氣方

免喉内生蛾

痘後生翳

卷之三

截藥

雜治門

取牙鯽魚霜又

黑髻倒捲簾

取輕粉毒

悅容丹

誤吞鐵石

足趾雞眼

取箭鏃

黑髻仙方又

受打不痛

面黑令白

脚減

截毛蟲傷

紅玉膏

竹木刺

中河鮑毒

虎傷

白菓丸

禿雞丸

神效乾丹

內造白虎丹

洗痿立興神丹

仙方紅緞膏

養龜立大方

展陽方

頂藥

巴霜頂

四寶頂

牛即頂

青綠頂

硫黃頂

輕粉頂

截瘡頂

金線頂

皂礬頂

吐蠱

倒頑痰法

串藥

牛即串

黑鹽頂

羊芙頂

三奇頂

砒霜頂

碧霞丹

瓜蒂散

陰陽湯

御霜串

黃甲串

烏龍串

犀黃串

牽牛串

龍腦串

車螯串 又

瀉腋氣

發背初起

絞腸痧

巴豆串

無極丸
脩急丸

輕粉串

天一水串

雙斗串

五香串

八寶串

腹脇痞塊

逐黃散

單方

總治門

金液丹

都梁丸

卷之四

單方

內治門

金粟丸

青藤膏

煖益膝腰

白虎丸

神傳膏

雞子飲

白虎歷節風

乾血病

瘡疾又

心疼

筋骨疼痛

哮喘又

酒積

積塊黃腫

洗眼中星

骨蒸勞病

治大風

卒心急痛

水腫

痰飲飲水

酒積酒毒

風眼赤爛

眼紅

睡起目赤

目生翳膜

驚風失音

小兒舌膜

鼻中肉墜

灌鼻出涎

耳內腫痛

痧脹腹痛

痞塊

治痞積

喉風

咽中結塊

鼻血不止

噴嚏丸

耳鳴

風熱牙痛

暑天怕風

膈氣

盜汗

消渴飲水

止呃逆

治痢初起

夢泄

乳汁不通

烏紗驚風

小兒舌筍

狐臭

神仙外應膏

白濁

變通丸

血崩

紅白淋帶

生乳

急慢驚風

蜆子水

驗胎散

鼻中出血

串雅內編

結目

稀痘神方

單方

外治門

國老膏

消癰酒

惡瘡打毒

壽星散

疔瘡

橫痃便毒

烏龍膏

止腫毒

快馬癰

多骨癰

起杖瘡疔皮

一切癰疽

脫疽

諸瘡努肉

癰腫無頭

腋下痛癰

乳癰又

瘰癧毒瘡

鷲掌風

散毒

痰核

指生天蛇

棉花瘡

消瘤

頭瘡生蛆

乳頭裂破

甲疽延爛

腿臂生瘡

洗癩頭

咽舌生瘡

十一

引才下者 魚

喉驚

金瘡

金刃不出

乳岩又

火燒爛

湯火傷

水腫脚氣

一抹膏

疔瘡走黃

跌打損傷

顛撲欲死

被斫斷筋

火燒瘡

火燎傷

癰

口吻生瘡

肛門痔痛

發背陰毒

項下氣癭

單方

襍治門

誤吞銅錢

竹木刺眼

齒黃

小兒初生膚無

固齒灰

寶女無竅

拔白換黑

食生米

飛絲入眼

嗜酒不已

禿髻髮稀

丈夫陰痿

奇病

小兒鱗體
獠犬咬傷
百脚齧
蝎毒螫傷
毒蛇傷
婦人乳癰
面上黑氣
誤吞針刺

兒陰被蚓吹腫
蛇虺咬
蜈蚣咬
誤食螻蛄
精清不孕
截溺
舌腫
搽魚骨鯁

猴子疳

產後肉線

截腸怪病

灸瘡成蝶

血壅怪病

臍蟲怪病

熱毒怪病

病笑不休

睛垂至鼻

山鞠散

髮癥飲油

米瘕嗜米

伐毛丹

眉毛動搖

筋肉化蟲

蟲出怪病

灸瘡出血

離魂

卷一百一十五 雜考

大腸蟲出

氣奔怪病

便後出血

細縕結

脈溢怪症

頭腦鳴響

蕩穢散

爛痘生疽

肉壞怪病

石室秘丹

活水止蟲丹

腹中生蛇

杜陳湯

化癢湯

救割金生湯

體中蚓鳴

臂生人面

舌縮入喉

舌血

男子乳腫

指縫出蟲

糞門生蟲

黃雷丸

喉中物行

病蟻

蛇蟲

渾身燎泡

掌高一寸

指甲盡脫

糞門出蛇

眼內肉線

手皮現蛇

病蝦

上水魚

惡肉毒瘡

肉錐怪病

足釘怪疾

熱毒濕瘡

猫眼睛瘡

消指散

祛火丹

消濕化怪湯

走皮趨瘡

咽喉怪症

肉人怪病

脣瘡生齒

手足脫下

附錄緒論

串雅內編卷一

錢塘趙學敏恕軒纂

截藥

總治門

黃鶴丹 乃鉢衣翁在黃鶴樓所授故名

香附一斤黃連半斤洗曬為末水糊丸梧子大如外感

葱湯下內傷米飲下氣病木香湯下血病酒下痰
病薑湯下火病白湯下餘可類推

青囊丸 乃邵應節真人禱母病方士所授

總治

一

香附一畧炒烏藥錢五兩三為末水醋煮麵糊為丸隨證用引如頭痛用茶下痰氣薑湯下血病酒下為妙

按飛霞子韓悉昔游方外治百病男用黃鶴丹女用青囊丸此二藥游方之祖方也

鯉鯪丸 治一切無名腫毒瘰癧尤效

歸尾錢五大黃 荆芥 桔梗 乳香炙沒藥炙各

黃芩 連翹錢各三防風 羌活各二錢五分全蠍錢六蟬

退二十个僵蠶二十條牛皮膠一兩雄黃分用金頭

蜈蚣四條去頭足

分作四樣法製一條用薑汁搽焙乾

一條用香油搽焙乾一條用醋搽焙乾一條用酥

搽焙乾再用川山甲四兩亦作四製一兩用紅花五

錢煎湯煮焙乾一兩用牙皂五錢煎湯煮焙乾一

兩用紫草節五錢煎湯煮焙乾一兩用蘇木五錢

煎湯煮焙乾

右藥共用為細末米醋打糊為丸每丸一錢二分

硃砂一錢五分共為衣瓷瓶收貯內放麝香五分

以養之每服一丸滾酒送下未成內消已成出膿

神效

蜜屏丸

治半身不遂口眼喎邪語言不利小兒驚

風發搐

槐花

炒四兩

當歸

川烏

元參

炒各二兩

麻黃

茯苓

乳防風

薄荷

甘草

各一兩

猪牙皂角

去皮弦子炒五錢

冰片

五分另研

先以前十味為末後入冰片和勻蜜丸

櫻桃大每服一丸小兒半丸細嚼清茶下

普濟丹

治一切瘟疫時氣惡寒發熱昏迷頭疼等症

大黃

製熟一兩五錢

生大黃

一兩五錢

僵蠶

三兩

生薑汁搗糊為

丸重九分七分五分三等遇瘟疫時症取無根井
花水即井中取起不落池之水服之視人老幼強
弱為多寡之數

蓬萊丸

治男婦老幼一切感冒瘟疫時症大人一

丸小兒孕婦及吐血虛人只服半丸

蒼朮

八兩米泔浸透陳壁土炒

半夏薑汁製

柴胡

黃芩

厚朴

姜汁炒

廣皮

枳實

炒羌活

蘇葉

木通

各四兩

查炒菜菔子

炒各六兩

共為末新荷葉煎湯和藥晒乾

加神麴六兩打糊為丸重三錢硃砂五錢雄黃一

總治

三

兩研末為衣頭骨疼發寒熱葱薑湯下咳嗽痰喘
薑汁湯下中暑香薷扁豆湯下瘧疾冲薑汁服紅
白痢木香枳榔湯下霍亂吐瀉藿香砂仁湯下腹
痛水瀉赤芍車前湯下飽悶陳皮木香湯下不服
水土廣藿香湯下山嵐瘴氣蠱毒蠱積枳榔湯下
諸症不識病原滾白水服忌食生冷麵食

發汗散

途路急用要藥

菜豆粉

麻黃

甘草

各一兩

為細末每服一錢冷

水送下即時汗出

松梅丸 健陽補中強筋潤肌大能益人

用松脂以長流水桑柴煮拔三次再以桑灰滴汁
煮七次扯拔更以好酒煮二次仍以長流水煮二
次色白不苦為度每一斤入蒸地黃末十兩烏梅
末六兩蜜丸梧子大每服七十九空心鹽湯送下
仙桃丸 治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打

撲傷損閃肋痛不可忍

生川烏

皮不去

五靈脂

各四兩

威靈仙

五兩

洗晒為末酒

糊丸梧子大每服七丸至十丸鹽湯下忌茶此藥

白豆至

常服其效如神

神健六先

金丸 有黑白二種藥共十四兩

味為白丸

黑豆至

白豆黃者二兩去大黃二兩川連三錢雄黃二兩膽星五錢

神健七味

神麴五錢黑豆黑者二兩去蝦蟇極大者一具須要黃者

為黑丸

須要黃

者以五

六字道

健行寫

乃蝦蟇

下注

用銀罐入內用油蓋蓋住鐵絲扎好外用炭火煨出黑烟至黃烟為度放地上冷透出火毒劈開如墨者良如小者用兩具五月五日午時煨青黛二兩石膏一兩滑石一兩胡連三錢神麴五錢石二種丸藥俱用生研水法為丸如米糲大每歲各一

丸勻服早晚每進一次

餘糧丸 治脫力勞傷

皂礬八兩用紅醋二茶 餘糧石煨四兩醋砂

仁四錢 姜白豆蔻 厚朴四錢 廣皮三錢 乾漆一

炒到 白芷二錢 川貝二錢 鐵梗五錢 茵陳五錢 海金沙一錢 益

母草一錢 廣木香二錢 地骨皮一錢 各為末黑棗為丸緩

症朝服七分夜服八分重症每服一二錢好酒下

此方不獨治腫脹如婦女乾勞產後朝涼暮熱男

婦反胃噎膈腹痛小兒喫泥生米等物及積年虛

總治

五

黃脫力黃疸等症極重者服至六兩全愈孕婦忌服服此藥須忌河魷終身蕎麥當忌

八仙丹 家傳秘方不拘小兒百病皆治

巴霜錢一硃砂分五鬱金分五乳香分二沒藥分三沉香分五木

香分四雄黃分六

右為末滴水為丸如粟米大每服二三丸隨宜引驚癇發搐金子湯下潮熱變蒸燈心湯下傷風傷寒薑湯下痰涎麝香薑汁竹瀝湯下食積肚痛山查麥芽湯下瘧疾燈心竹葉麥芽湯下痢疾泄瀉

薑汁湯下

花蕊石散

治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損狗咬

至死者急以藥摻傷處其血化為黃水再摻便活
更不疼痛如內損血入臟腑煎童便入酒少許熱
調一錢服立效畜牲抵傷腸出不損者急納入桑
皮線縫之摻藥血止立活婦人產後敗血不盡血
運惡血崩心胎死腹中胎衣不下至死但心頭溫
暖者急以童便調服一錢取下惡物如猪肝終身
不患血風血氣若膈上有血化為黃水即時吐出

或隨小便出甚效

硫黃

四兩 慈石

一兩

並為末拌勻膠泥固濟日乾瓦罐

一個盛之泥封口焙乾安西方磚上磚上書八卦
五行用炭一称簇通從巳午時自下生火煅至炭
消冷定取出為細末瓶收用

三黃丸

療男子五癆七傷消渴不生肌肉婦人帶

下手足寒熱瀉五臟火

春三月黃芩

四兩

大黃

三兩

黃連

四兩

夏三月黃芩

六兩

大黃

六兩

冬三

黃

一兩

黃連

七兩

秋三月黃芩

六兩

大黃

三兩

黃連

一兩

冬三

黃

三兩

月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三時隨時合搗下篩蜜
丸烏頭大米飲每服五丸日三不知增至七丸服
一月病愈久服走及奔馬人用有驗忌豬肉

紫陽真君塞鼻丹

沈木乳沒四味香牙皂華撥大良薑官桂細辛各
等分巴豆川烏好麝香又加雄黃硃砂等血竭硃
砂共裹勑丸頭一粒指頭大呼吸鼻氣病離床心
疼肚痛塞鼻孔腦脹痧氣不須忙水泄痢疾時聞
住牙痛見了笑一場赤白痢下俱痊可渾身疼痛

即安康紫陽真君無虛語妙藥傳施普八方好將
一粒隨身帶途中百病亦無妨

神仙太乙膏

治一切瘰癧疽瘡毒已未成潰者如發

背先以溫水洗淨軟絹刷乾用緋帛攤貼更為丸
冷水送下血氣不通溫酒下赤白帶當歸酒下咳
嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹置口中嚙化一切
風赤眼捏作小餅貼太陽穴更以山梔子打撲傷
外貼內服橘皮湯下腰膝疼痛貼患處鹽湯下吐
血桑陂湯下以蛤粉為衣其膏可收十餘年不壞

又治瘰癧並用鹽湯洗貼酒下一丸楊梅瘡毒潰爛尤效婦人經脉不通腹痛甘草湯下并攤貼之經行痛止一切疥瘡用麻油煎滾水和膏塗之虎犬蛇蝎傷刀斧傷皆可服貼

元參

白芷

當歸

赤芍

肉桂

大黃

生

~~地~~各一

兩

麻油

二斤

入銅鍋

內煎濾去渣

入黃丹十

二兩

煎摘水

捻硬得中即成膏矣腫毒跌撲

疼痛加乳香沒藥製丹法黃丹先炒紫色傾缸內用滾水一桶泡之再汲涼水滿缸用棒常攪浸一

宿去水再炒如前二次方研令細用

截藥

內治門

通真子救苦丹

治大人小兒感冒風傷寒

麻黃去根節洗淨晒干細布取汁餘渣再搗再浸取汁必要潔淨用

臘為甘草炙以去皮淨研極細末四赤勺細末兩研極細

上照前升微炒一兩研極細末四赤勺細末兩研極細

取汁照前升微炒一兩研極細末四赤勺細末兩研極細

飛雄黃一兩細末五錢研極細末四赤勺細末兩研極細

細末一兩溫柴胡去溫研極細末四赤勺細末兩研極細

浸取枳實去心研極細末四赤勺細末兩研極細

串雅內編 卷一

內治

九

水飛秋冬

加枝皮五錢研極細末此藥骸有厚薄味有清濁

故用水溫涼而多寡不同各味浸透濃鹹精細共

合一處細羅再濾三五遍陰乾研醋糊為丸黍米大

每服一九雄黃五分研極細新汲水半盞調雄黃

連藥送下用厚被蓋暖處香燒三寸汗出即愈重

者二九即效製藥用庚申甲子日淨室中莫令雜

犬婦人見之

半分散 治傷寒頭痛身痛發熱惡寒無汗

雄黃 南星 半夏 川烏 草烏 硃砂 丹加

一味號天麻薑蔥酒調送下傷寒無汗被蓋之萬
兩黃金無價

右藥共為末每服半分出汗如神

治傷寒結胃

水姜一枚搥碎入甘草一錢同煎服之

食結在胸非大黃芒硝枳殼枳櫨厚朴之類可能
祛逐必得水姜始得陷之入于脾中尤恐其過于
下也少加甘草留之且得水甘草之和不到十分推
蕩此變症而用變法真勝于用止也

拿瘡

黃丹生用錢五 白明礬生用錢三 胡椒分一錢五 麝香分半 各為

末臨發時對日坐定將好米醋調藥末男左女右

縛手心外將絹帕緊紮待藥力熱方行出汗為度

如無日脚下用火此藥一料能治三火年老怕服

藥及牙身弱者用之

宣木散 專散肝木中之火肝火既達則諸經中之

火盡散

白芍錢三 柴胡錢二 丹皮錢二 元參錢三 麥冬錢三 荆芥錢三 生

地錢三梔子錢炒三防風錢一天花粉錢二水煎服
升陰陽 李東垣製補中益氣湯凡陽虛下陷用以
升提而陰虛下陷者不及今增之凡陰虛脾泄歲
久不止或食而不能化或化為瀉泄以此方主治
方失載

辟瘟丹

以蒼朮為君倍用羌活獨活白芷香附大黃甘松
三奈赤箭雄黃各等分為末麩糊丸如彈子大黃
丹為衣晒乾焚之

截頭風

治偏正頭風百藥不效一服便可天下氣

一方也

香白芷

錢二兩五

川芎炒甘草炒

川烏頭

各半生半熟

為末每服一錢細茶薄荷湯調下

頭痛 兼治腦疼

川芎

兩一

沙參

兩一

蔓荊子

錢二細辛

加黃酒半碗調勻早晨服之一劑永不冉發

鶴頂丹

治痰氣結胃不問陰陽虛實妙過陷胸瀉

心等藥

銀硃鐵明礬一同研以熨斗盛火瓦盛藥鑄化急刮梳九每服一錢真茶入薑汁少許服之心土隱隱有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀硃破積故也

痰火神方

牛黃 硃砂各一冰片五厘麝香三厘將蝦蟇取膽和
前四味末藥收礮將舌尖刺破點藥其痰即時下
行妙

時行痰嗽

面目浮腫終夕不寐

內治

蜂粉少許加青黛用淡鹽水滴麻油數點調服三錢

保靈丹 治蠱毒諸毒一切藥毒

大山豆根錢五雄黃一兩硃砂一兩研黃藥子黃丹

麝香班蝥去頭足各糯米半生赤蜈蚣二條一

川巴豆肥者取肉不續隨子生杵末二錢半

右藥入乳鉢研細末和勻端午重陽日修合宜

避婦人及雞犬用糯米湯和丸如龍眼核大陰乾
蠱盒收每一丸好清茶吞下不得嚼破須臾毒物

下藥丸凝血並下以水淨收可救三人

交感丹 治一切名利失意抑鬱煩腦七情所傷不

思飲食面黃形羸胸膈諸症極有神效

香附末 二斤用瓦器炒令熟神末去皮為末煉

蜜丸彈子大每服一丸空心細嚼白湯下或降氣

湯下

附降氣湯 虛陽上收氣不升降上盛下虛痰涎

壅盛

蘇子 一錢五分 厚朴 陳皮 半夏 官桂 前胡 各

內治

主

錢甘州五水二鍾姜三片煎服

治尸厥凡見鬼者煎治之

蒼朮三片水六碗煎三碗灌之盡必吐後即愈

獨步散治心脾氣痛凡入胸膈軟處一點痛者多

因氣及寒起或致終身子母相傳俗名心氣痛非

也乃胃腕有滯惟此治之妙

香附米醋浸為末良姜酒洗俱各封收因寒者

姜二錢附一錢因寒者附二錢姜一錢因氣與寒

者各等分和勻熟米湯入姜汁一起鹽一捻調下

立止不過七八次除根

膈氣暫開方

荔枝

去一個核

將蜆蜊一條放在荔枝肉內冰片

三四

搽在蜆蜊上即將荔枝肉裏好仍放在荔枝壳肉

扎好即令病人含在口內有冷涎水滲出可徐徐

嚥下俟一時許蜆蜊即化完亦無水滲出令病人

連壳吐去即服一次可以立愈進飲食四五月但

不可令病人知之恐其嫌穢不肯吃也

起癰

神方治痿病久不效服之神效

串雅內編 卷一

麥冬片熟地片各七兩五味子兩水三十碗煎六
碗早晨服三碗下午服二碗半夜服一碗一連二
日必能坐起後改用熟地八兩麥冬四兩元參三
兩北五味三錢山茱萸四錢牛膝一兩水十碗煎
二碗早晨服一碗晚服一碗十日即能行步一月
即平復如旧矣

坎離丸 此藥取天一生水地二生火之意藥輕而
功用大久服而取效速先賢王道之藥無出于此
大能生精益血升水降火故能治虛損

當歸全用三日好酒洗川芎大者用清
水白芍洗淨
對淨用三日好酒洗對碎去毛各四兩熟地黃八兩淮
一兩兩用砂炒赤知母製同各四兩熟地黃八兩淮
四兩兩用砂炒赤知母製同各四兩熟地黃八兩淮
用酒二壺煮乾去二味與同入絹袋厚黃柏去
人乳浸二兩鹽水浸二兩酒浸二兩
右六味修製明白和合一處平鋪三四分厚夜露
日晒三日夜以收天地之精日月之華研細末用
正冬蜜一斤八兩加水半碗共煉至滴水成珠再
加水一碗煎一滾和前藥丸桐子大每服八九十
丸空心鹽湯下冬用溫酒下

元德膏

治聞雷即昏倒不省人事此氣怯也

人參

當歸

麥冬

各二兩

五味子

錢五

用水一斗煎

取五升再以水五升煎取二升合熬成膏每服三匙白湯調水服盡一斤聞雷自若

解惡仙丹

治中惡中痰

人參

錢三

茯苓

錢五

天南星

錢三

附子

錢一

虛人多加人參

水煎服即甦

治老人不寐

六味地黃丸一料加麥冬四兩炒杏仁五兩黃連

三錢肉桂五錢當歸三兩白芍五兩甘菊花三兩
要家園自種者白芥子二兩共研為末蜜丸每日
白滾水送下五錢服後用飯此方老人可服至百
歲

安寐丹 治怔忡不寐等症

人參錢三丹參錢二麥冬錢三甘草錢一茯神錢三生棗仁錢五
熟棗仁錢五菖蒲錢一當歸錢三五味子錢一水煎服

瀉火聖神湯 治各經之火

梔子 丹皮 元參各三錢白芍錢五甘草錢一水煎服

心火加黃連錢一肺火加黃芩錢一胃火加石膏錢三腎
火加知母錢一黃柏錢一大腸火加地榆錢一小腸火加
天冬麥冬錢各二膀胱火加澤瀉錢三
鬼毒風氣

獨頭蒜一枚和雄黃杏仁研為丸空心服飲下三丸

靜坐少時當下毛出即安

截酒積 治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒積停于

胃間遇飲即吐久而成癖

雄黃皂角子大六個巴豆連皮油十五個蝎稍十

十五个同研入白麪五兩半滴水凡豌豆大將乾入麪內炒香將一粒放水試之浮則取起收之每服二丸溫酒下

靈寶化積膏 治積聚

巴豆仁 車麻各一 五靈脂四兩 阿魏化 醋煮當歸各一

兩頭尖 穿山甲 乳香去油 沒藥去油 麝香

三松香半片 芝麻油五兩 除麝香松香阿魏乳香沒

藥外餘藥俱飲片浸油內三日用砂鍋煎熬藥焦

黑色去滓入松香少煎一飯時再入乳香沒藥麝

香取起入水中抽洗金黃色煎時以挑柳枝不住
手攪勻勿令枯用狗皮攤貼患處每日以熱鞋底
熨令藥氣深入為妙

燒鍼丸

此藥清鎮專治吐逆

黃丹不拘多少研細用去皮小紅枣肉丸黃子大
每用鍼簷于燈上燒過人乳汁下一丸

蚕蚕散

治山野人好齧蟲腹中生長遂成瘰癧久

則死

敗梳敗篋各一各破作二分燒以一分用水五升

煮取一升調服即下出

截癲 治失心癲狂

真鬱金

而明礬而三

所為末薄糊丸如梧子大每服

五十丸白湯下有婦人癲狂十年至人授此初服
心胸有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂痰血
絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故
也

回癲湯

治羊癲症忽然倒卧作羊鳴之聲口中吐

痰如湧痰迷心竅因寒而成感寒則發也一劑全

愈永不再發

人參錢三白朮

兩一茯苓

法仁

錢各三

山藥

半夏各三

錢肉桂

附子

錢各一

水煎服

此症得之小兒之

時居多內傷脾胃外感風寒結成在胸膈之中所以一遇風寒便發舊痰今純用補正之藥不盡祛痰轉能去其病根也若作風痰治之雖亦奏功終不能一止而不再發

收呆至神湯 呆病鬱抑不舒憤怒而成者有之羞而成者有之

人參 柴胡 當歸各一兩 白芍四兩 半夏二兩 甘草五錢

生枣仁一兩 天南星五錢 附子一錢 菖蒲一兩 神麴五錢 茯苓

三兩 鬱金五錢 水十碗煎一碗灌之彼不肯飲以雙手

執其頭髮兩人拿其左右手以一人托住下顙額一

人將羊角去共挿入其口一人以手拿其住頭一

人傾藥入羊角內灌之倘或吐出不妨益妙盡灌

完為至彼必言罵少頃人因欲睡聽其自醒切勿

驚動使彼自醒則全愈驚醒則半愈矣

逐呆仙丹 呆病如癡默々不言如飢而悠々如失

意欲癲而不能心欲狂而不敢有時睡數日不醒
有時坐數日不眠有時將已身衣服密密縫完有
時將他人物件深藏掩與人言則無語而神游
背人言則低聲而泣訴與之食則厭薄而不吞不
與之食則吞炭而若快此等症皆由痰氣若以尋
常二陳湯治之安得獲效

人參^{一兩}白朮^{二兩}茯神^{三兩}半夏^{五錢}白芥子^{一兩}附子^{一兩}
五^分鬼^{一兩}然^{一兩}子^{一兩}白^{一兩}微^{三錢}錢^{三錢}丹^{三錢}砂^{三錢}
丹砂末與牛碗與食彼不肯服以炭給之欣然服

矣又給之又服半梳然後聽其自便彼必倦怠欲
卧矣乘其睡熟將其衣服被褥盡行火化單留身
上所服之衣則不化另用新被蓋之切不可驚醒
此一睡有至數日者醒來必覓衣而衣無覓被而
被非故物彼必大哭然後又以前藥與一劑彼必
不肯服即給之炭亦斷不肯笑不妨以鞭責之動
其怒氣用有力之人將藥執而灌之彼必大怒已
而又睡去矣此時斷須預備新鮮衣服被褥等項
俟其半日即醒心中恍然如悟必又大哭而病全

愈矣

啟迷奇效湯

治癲癩經年不愈者

人參一兩南星錢五鬼箭錢三半夏錢一附子錢一肉桂錢一柴
胡錢三白芍錢三菖蒲錢二丹砂末錢二先將前藥煎二椀
分作二服將丹砂一半調入藥中與病人服之彼
不肖服即以炭給之彼必欣然服之索炭也不妨
仍與之炭第二服亦如前法則彼不若前之欣然
令人急灌之不聽不妨打之以動其怒氣怒則肝
木火起以生心反能去痰矣

啟迷丹

治發厥口不能言眼閉手撒喉中作酣聲

痰甚盛有一日即死者有二三日而死者因素有痰氣而發也

生半夏

錢五

人參

錢五

菖蒲

錢二

鬼絲子

兩

甘草

分三

茯神

錢三

皂莢

錢一

生薑

錢一

水煎服

起痿神湯

治痿症

元參

兩一

熟地

兩三

麥冬

兩四

山茱萸

兩一

沙參

兩三

五味子

兩五

水煎服

五錢

水煎服

摩腰丹

治寒濕腰痛

附子尖

烏頭尖

南星

硃砂

乾姜各一
錢一雄

黃

樟腦

丁香

麝香

各五
分

右爲末蜜丸圓眼大每服一丸姜汁化開如厚粥
烘熱置掌中摩腰上令盡粘著肉烘綿布縛定腰
熱如火妙間三日用一丸或加茱萸桂

貼腰膏

治腰痛

生薑

一片取真
汁四兩

水膠

一兩

用煎成膏厚紙攤貼腰服

甚效

威喜丸

治丈夫陽虛精氣不固小便白濁餘淋常

流夢寐多驚頻遺泄婦人白濁白帶皆除

黃蠟四兩白茯苓

去皮四兩切塊用猪苓一分于器內同煮二十餘沸取出日晒不用

猪苓右以茯苓末溶黃蠟丸彈子大每服一丸空心

細嚼津液嚥下以小便清為度忌米醋

截肢

治水腫氣腫

活黑魚

一尾重七八兩

去鱗甲將肚剖開去腸入好黑礬

五分松蘿茶

錢三

男子用蒜八瓣女七瓣共入腹內放

磁器中蒸熟令病人喫魚連茶蒜喫更妙藥從頭

上喫起病從頭上消從尾上喫起病在足上消立

效

蟲腋 小兒作痛四肢浮腫面色帶紅點如蟲蝕之

象眼下無卧蠶微腫之形此是蟲腋也

雷丸

錢三當歸

一兩

醋炙

地栗粉

二兩

鮮者取

神

麴錢

茯苓

錢三

車前子

錢五

白礬

錢三

水煎服

血腋

跌閃而血瘀不散或憂鬱而結血不行或風

邪而血畜不發遂至因循時日留在腹中致成血腋

飲食入胃不變精血反去助邪久則脹之則成腋

矣

水蛭三錢炒黑取末大約一兩當歸二兩雷丸三錢紅花

枳實白芍牛膝三錢桃仁四十粒去皮尖搥爛

水煎服一服而下血斗餘再服血盡而愈

分水神丹 治水瀉

白朮兩車前子五錢煎湯服之立效

疝氣神方 其病甚至氣上衝如有物築塞心臍欲

死手足冷者三四服除根

硫黃火中溶化即投荔枝核炒黃陳皮各等為末

飯丸桐子大每服十四丸酒下其疼立止自覺疼

甚不能支持畧用六丸不可多

千金不傳韋氏方 治疝及腎大如斗日三服除根

八角大茴香

青皮

荔枝核

各二兩

炒黃色烟盡

為度置土上以碗覆之少時取出研末每服二錢

無灰酒下清晨午後臨睡各一服

去鈴丸

治脾虛弱小腸疝氣神效

大茴香

二兩

生薑

連皮

同入

坩器內

淹一伏時慢火

炒之入鹽一兩為末九梧子大每服三五十九空

心鹽酒下

腹內龜病

詩云人間龜病不堪言肚裏生成硬似磚自死僵
蚕白馬尿不過時刻軟如綿神效

返魂丹 治五色諸痢

零陵香草去根以鹽酒浸半月炒乾每兩入廣木
香一錢半為末裏急後重者用冷水服一錢半痛
急三四次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一
味

鐵刷丸 治一切痢下初起一服如神

百草霜

錢三

京墨

錢一

半夏

分四

巴豆

煮十四粒

研勻

黃蠟

錢三

同

香油化開

和成劑量

大小每服

三五丸或四五十

丸薑湯下

九薑湯下

截瀉丸

治一切久瀉諸藥無效服此一服自愈

黃丹

飛過

枯礬

黃蠟

各一兩

石榴皮

炒八錢

將蠟溶化

小銅杓再以丹礬三味細末投入乘熱為丸如豆

大空心服五丸紅痢清茶下白痢薑湯下

寧和堂暖臍膏

治水瀉白痢神效孕婦忌貼

香油

一斤一方用麻油

生薑

切片一斤

黃丹

飛過半斤熬膏內攤布貼臍上

內

有紅藥丸

附紅藥丸

硫黃

三錢一
方不用

母丁香

錢一

麝香

分三

加獨頭蒜

數枚

方一

不搗如泥再入前三味研勻成桐子大飛過硃砂

為衣母丁香四粒麝香一分土木鼈一個研末唾

津為丸如芡子大納臍中外用膏藥貼亦可治小

兒痢

截水腫

遍身腫滿手按之仍起者是

葶藶

炒四兩

為末夾肉為丸梧子大每服十五丸桑

皮湯下人不信試之自驗

截黃

治脾積黃疸

青礬

赤四兩煨成珠子

當歸

四兩酒焙七日

百草霜

三兩為末以浸葯酒

打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫水下一月後

黃去立效此方祖傳七世

斷痢

木鱉仁

六分作二研洗二分起燒餅作一個切

只角半餅作一

竅納葯在內乘熱覆在病人臍上一時再換半個

熱餅其痢即止遂思飲食

加味綠礬丸

治大小男婦黃病

皂礬

八兩用麴飭和作餅入蒼朮

厚朴炒姜汁新

會皮

甘草

各八兩川椒炒去目

右研為末用紅

棗三斤煮熟去皮核胡桃三斤去殼同搗成膏和

藥丸桐子大每服七八十丸酒服初服時覺此藥

甘美服至病將愈反覺藥臭矣大率四兩藥可治

一人

點日取翳

驚不食草搗汁熬膏一兩炉甘石火煨童便滓三

次三錢上等礞器末一錢半熊胆二錢硃砂少許
為末和作膏貼在翳上一夜取下用黃連黃柏煎
湯洗淨看如有丹貼

治目多淚

鯽魚胆七人乳盞一和勻飯上蒸一二次點眼其泪
自收

仿西洋眼藥

猪苦胆取汁東丹拌勻加水片青黛各少許檄成
條子能于盤中分墨市中賣者用此

二百味花艸膏 治目病兩臉赤濕流淚或痛或痒

畫不能視夜不能見燈名爛緣風

羯羊膽去其中脂而滿填好蜜拌勻蒸之候乾即入瓶細研為膏以蜜採百花羊食百草故名

截障 治眼中努肉

蛇蛻一條麻油三錢炒黃色菜豆三合砂糖一共煎

七分食遠服立退二三年者可治兩服即愈

開聲

小蝎四十個生薑如蝎大四片同炒薑乾為度研為細

內治

末溫酒服之到一二更時再進一服至醉不妨次日耳中如笙簧聲即效十年腎虛聾者服二服可愈

耳聾開竅奇方

活鯽魚一尾不拘大小劈開取腦髓盛飯上蒸出油來將茶匙挑滴入耳內數次自然開竅後服補藥收功

補藥方

破故紙 黑芝麻

童便

各一
火酒二

取右四味同煮乾取出晒焙再將黑芝麻同故紙等共炒香取故紙為末不用芝麻以老米醋打糊為丸菜豆大每服二錢用杜仲炒去絲知母煎湯送下服一半即效

通耳神丹

鼠胆一枚龍齒一分冰片 麝香 硃砂各一分乳香

潮腦各半分

右藥各研末人乳為丸如梧子大外用絲綿裹之塞耳深處至不可受而止塞三日取出即耳聰永

牙
下
然
三

不再聾

喉風閉塞

臘月初一取猪膽不拘多少大五六枚用黃連

青黛 薄荷 僵蚕 白礬 朴硝 錢各五 裝入胆

內青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸

膽在內以物蓋定候至立春日出待風吹去胆

皮青紙研末密收每吹少許神驗

吹喉藥 治急經喉風乳蛾喉痺

白礬 錢三 已豆 五粒 去壳 用鉄杓將礬化開投已豆在內

礬乾了取出已立將礬收貯遇喉痛者以蘆管吹之

黑龍骨 治九種喉痺急喉纏喉風結喉爛道蟲、
蝶重舌木舌飛然入口

大皂角四十挺切水三斗浸一夜煎至一斗半入
人參末半兩甘草末一兩煎至五升去渣入無灰
酒一升釜煤二匕煎如飴入瓶封埋地中一夜每
溫湯送下一匙或掃入喉內取惡涎盡為度後含
甘草片

永梅丸 治喉痺十八種俱效

天南星

鮮者二十
五個切片

大半夏

者五十個
佳切片鮮

皂角

去弦淨
四兩

白礬

鹽

防風

朴硝

各四兩

桔梗

二兩

揀七分熟

梅子大者一百個先將硝鹽水浸一周時然後將

各藥研碎入水拌勻方將梅子置水中其水過梅

子三指為度浸七日取出晒乾入水中浸透晒

乾為度候藥水乾方將梅子入礮器密封之如霜

衣起愈妙用時薄綿裹噙口內令津液徐徐嚥下

痰出愈一梅可治三人不可輕棄

中分散 治驚風定搐

螳螂

个一 蜥蜴一條一

赤足蜈蚣一條各中分之隨左右所

末記男用左女用右每以一字吹鼻內搐之右即
右定左即左定

仙傳急驚散

治大人中風中痰服之立效濟人甚

妙不可受謝

生石膏

兩十辰砂錢五

共研細末和勻大人每服三錢

小兒一歲至三歲一錢四歲至七歲一錢五分八
歲至十二歲二錢十三歲至十六歲二錢五分用

生蜜湯調下累用累驗

神穴丹 治驚風癇疳

紫色蛇黃

四兩煨過

猪屎

二兩泥固煨過

鐵粉

一兩

硃砂

五錢

麝香

香錢為末糯米粉糊丸芡子大漆鹽晒乾看之每

丸有一小穴故名每服一丸薄荷酒化下立醒疳

熱冷水化下

陳氏神效小紅丸

治小兒一切咳嗽驚癇發搐發

熱驚喘痰涎上湧痰厥卒倒等症

全蝎

去刺洗淨

南星

一兩

硃砂

四錢

珠子

一錢

巴豆霜

去淨
二錢半

右為細末糯米糊為丸如菜子大週歲者每服五
十九二週者百丸凡看小兒大小壯實用燈心煎
湯送下此吳中陳氏治急驚風秘方也

稀痘丹

赤豆黑豆粉草各一兩為末用竹筒刮去皮兩頭苗

節一頭鑿一孔以藥末入筒中用杉木塞緊黃蠟
封固外以小繩繫之投入臘月厠中滿一月即取
出洗淨風乾每一兩配臘月梅花片三錢和勻若

得雪中梅花落地者不著人手以針刺取者更妙
急用入紙封套內焙烘即乾兒大者用一錢小者
五分俱以霜後熟灰藤上小熟灰煎湯調空心服
湯宜多服忌葷腥十二日餅出黑糞為驗一次可
稀三次不出每年服一次

梅花丸

治小兒痘疹起死回生之病

臘月取梅花不計多少陰乾有一兩外用當歸一
錢五分茯苓一錢升麻五分竹茹八分甘草三分
水一鐘半煎八分至溫熱時將梅花拌浸一日取

出晒乾研為末如小兒病用雄雞一隻吊起左足
良久將竹鎗入雞喉內取血調梅花末為丸如菜
豆大滾水送下二丸即刻見功如小女兒病用老
雌雞吊起右足取血製造晒乾以好磁器收貯不
計遠年近日聽用此方濟人萬無一失小兒臨危
任是毒甚畧有微氣用滾水送下不拘時只不宜
多服

換痘丹 凡痘密如蚕種皮毛一片者服此毒便解
即變換另發一層好痘起死回生

犀角 梅蕊 熬灰 各一 雄黃 錢一 硃砂 錢二 滑石 錢一 麝香 分三

右為末用麻黃膏丸如芡子大每服一九酒漿化下

釘胎丸 治頻慣墮胎三四月即墮者于兩月前合此服之

杜仲 兩八 糯米 煎湯浸透炒去黑續斷 兩二 酒浸焙乾為末以山藥 兩五 六為末作糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

治傷寒

糯米粽無棗者和滑石末研成錠曝乾燒炭浸酒
去炭熱飲之不論七日內者即汗七日外者次日
汗

千金硝石丸 止可磨塊不令困人須量虛實

硝石^{六兩} 大黃^{八兩} 人參 甘草^{各三兩}

石為細末以三年苦酒置器中以竹片住準每入
一升作一刻先入大黃不住手攪便微沸盡一刻
乃下餘藥又盡一刻微火熱便可丸桐子大每服

三十丸服後下如雞肝米泔赤黑色等物為效下
後忌風冷宜軟粥調理

珍珠滾痰丸

治小兒痰塞心胸服之立效

半夏

三十粒

巴豆

三十粒 去壳

同半夏煮待半夏熟爛取

起去巴豆止用半夏烘乾為細末米糊為丸如菜
子大用硃砂為衣晒乾用蘿蔔汁吞服七丸大人
倍之

接骨仙桃草

葉如石榴葉實如桃子內有小蟲食真

取實連蟲用

金橘核 福橘核 畢澄茄各等分用砂糖糊丸
菜豆大專治肝氣胃小腸疝症每晚服一錢許至
重者兩服斷根